

About Stroke – Fact Sheet (Arabic)

ما الذي يجعل النوبة الإقفارية العابرة (TIA) مختلفة؟

إن الأحرف الإنجليزية TIA مختصر لـ transient ischaemic attack ويعني النوبة الإقفارية العابرة. وتحدث النوبة الإقفارية العابرة عندما ينقطع تدفق الدم عن الدماغ لفترة قصيرة. علامات النوبة الإقفارية العابرة هي نفسها كعلامات السكتة الدماغية، غير إنها تزول وتختفي وحدها. غالباً ما تدوم هذه العلامات بضع دقائق فقط.

لا تتجاهلو النوبة الإقفارية العابرة أبداً.
اتصلوا بثلاثة أصفار (000) على الفور، حتى لو اختفت العلامات وشعرتم بتحسن.



Recognise STROKE Think F.A.S.T.

F Has their FACE drooped?
A Can they lift both ARMS?
S Is their SPEECH slurred and do they understand you?
T Call 000, TIME is critical

If you see any of these symptoms
Act FAST call 000

Stroke FOUNDATION

علامات السكتة الدماغية

أي الوجه - إفلاخ وجه الشخص. هل أصبح فمه مرتخياً؟
 أي اليدين - هل يستطيع أن يرفع يديه الإثنتين؟
 أي النطق - هل يتلuent في الكلام؟ هل يفهم ما تقول؟
 أي الوقت - الوقت حرج. اتصل بثلاثة أصفار (000) الآن إذا رأيت أي من هذه العلامات.


شارك عائلتك وأصدقائك رسالة "فاست F.A.S.T".

ما هي السكتة الدماغية؟

تصيب السكتة الدماغية الدماغ، الذي يتحكم بجسم الإنسان. يحتاج الدماغ إلى أوكسجين وغذيّيات ينقلها الدم. تحدث السكتة الدماغية عندما لا يلتقي الدماغ الدم الذي يحتاجه.

تموت الخلايا الدماغية بسرعة عندما لا تصل إليها كمية كافية من الدم. ما يصل لغاية 90 مليون خلية دماغية يمكن أن تموت في كل دقيقة.

هناك نوعان للسكتة الدماغية:



السكتة الدماغية التزفية
"hemorrhagic stroke"
عندما ينفصل أو ينفجر الشريان

السكتة الدماغية الإقفارية
"ischaemic stroke"
كلاتيك (is-key-mick) وهي تعني
"الإقفارية" أي عندما تسد جطة دم أو
لوحة دم الشريان

كل سكتة دماغية تختلف عن الأخرى. تعتمد طريقة تأثير السكتة الدماغية على الإنسان على مكان حدوثها في الدماغ وعلى مدى خطورتها.

يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على جسم الإنسان وعواطفه وطريقة تفكيره. يمكن أن تؤدي إلى ضعف في العضلات، ومشكلات في النطق والذاكرة والسمع أو النظر.


تعتبر السكتة الدماغية دائماً حالة طبية طارئة.
اتصلوا بثلاثة أصفار (000) عند ظهور أول علامة من علامات السكتة الدماغية.

خمسة إرشادات حول الحياة السليمة

- **أطلب إجراء فحص لضغط الدم.** إن ضغط الدم المرتفع هو أكبر عامل من عوامل خطر الإصابة بسكتة دماغية. لا تستطيع معرفة ما إذا كنت مصاباً بارتفاع في ضغط الدم دون أن يفحصك طبيبك أو الصيدلاني. والفحص سريع وغير مؤلم.
- **إفحص الكوليسترول.** أطلب من طبيبك أن يفحصك لمعرفة ما إذا كانت نسبة الكوليسترول مرتفعة في دمك. تستطيع خفض نسبة الكوليسترول لديك عن طريق عدم تناول الدهون المشبعة، مثل الدهون الحيوانية.
- **تحدث مع طبيبك عن داء السكري.** تستطيع التحكم بالنمط 2 من السكري عن طريق تناول الطعام الصحي، وممارسة التمارين المنتظمة وفحص معدلات السكر في دمك.
- **إفحص النبض في حال كان غير منتظم.** يحدث الرجفان الأديني عند عدم حفقان قلبك في وتيرة منتظمة. تحدث إلى طبيبك حول كيفية العلاج.

خصص وقتاً للفحص الصحي.


راجع طبيبك للقيام بفحص دوري لمعرفة ما إذا كانت لديك عوامل خطر الإصابة بسكتة دماغية. وهذا أكثر أهمية على الأشخاص إذا كنت فوق 45 سنة من العمر.



- **اجعل نظامك الغذائي متوازناً.** تناول الفاكهة والبقول والخضار واللحوم الخالية من الدهون، والدجاج والسمك، والحليب القليل الدسم والزبادي. قلل من تناول الدهون الحيوانية.
- **امتنع عن الملح.** إقرأ اللاصقة الموجودة على غلاف الطعام لمعرفة كمية الصوديوم الموجودة فيه.
- **بدل السكر.** تناول المكسرات أو الفاكهة الطازجة بدلاً عن الحلويات كوجبات صغيرة. إشرب الماء بدلاً من المشروبات السكرية.
- **تناول الأطعمة الطازجة.** إشتري الأطعمة الطازجة من السوق. قلل من تناول الطعام المصنّع.

تناول الطعام بشكل جيد.

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيء إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وداء السكري، والمرض القلبي والسكبة الدماغية. إن تناول الطعام السليم مهم من أجل خفض خطر تعرضك لسكتة دماغية.



- **مارس رياضة المشي.** تنزه سيراً على الأقدام أو امش في غابة أو حديقة عامية بدلاً من قيادة السيارة. حاول المشي بطريقة أسرع من سرعتك العادمة في المشي.
- **تسجل في صف أسبوعي.** مثلاً، يمكنك تعلم الرقص في صف، أو الرياضة في الهواء الطلق أو تمارين رياضية متعددة.
- **قم بالتحرك في الهواء الطلق.** استمتع في الأماكن المفتوحة في الهواء الطلق عن طريق ركوب الدراجة مثلاً، أو السباحة، أو العمل في الحديقة.

حافظ على نشاطك.

يمكن أن يؤدي عدم النشاط والحركة، والوزن المفرط أو احتواء الجسم على كمية كبيرة من الدهن إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. مارس التمارين الرياضية بانتظام.



لا تتناول الكحول إلا بكمية معتدلة.

إن خطر التعرض لسكتة دماغية أكبر إذا تناولت المزيد من الكحول.



- **فيتو قبل ان تشرب.** يمكن أن يؤدي تناول الكحول بشكل دوري وبكمية كبيرة إلى ارتفاع ضغط الدم وإلى زيادة خطر تعرضك لسكتة دماغية.
- **توقف عند الإثنين.** لا تتناول أكثر من كأس كحول عاديين في اليوم.

ابعد عن التدخين.

يزيد التدخين ضغط الدم ويقلل الأوكسجين المنقول إلى الدماغ. فالتدخين يضاعف خطر إصابتك بسكتة دماغية.



StrokeLine 1800 STROKE (1800 787 653) ☎

strokefoundation.org.au 📱

strokefoundation/ 📱

strokefdn@ 🐦

strokefdn@ 📽

نبذة عن Stroke Foundation

جمعية خيرية قومية تتشارك مع أفراد المجتمع في سبيل الوقاية من السكتة الدماغية، وإنقاذ الحياة وتعزيز التعافي.